

HAUTTUMORE

Gutartige Hauttumore wie zum Beispiel Muttermale können oft mittels einfacher Excision entfernt werden, bösartige Tumore zum Beispiel Basaliome oder Plattenepithelcarcinome müssen mit einem Sicherheitsabstand entfernt werden.

Vor dem Eingriff:

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (Marcoumar, Thrombo ASS,...) eine Woche vor dem geplanten Eingriff, sowie eine Woche danach.

Beschränken Sie oder noch besser stoppen Sie den Nikotinkonsum mindestens für 2 Wochen vor dem Eingriff bzw. 4 Wochen danach.

Während des Eingriffs:

Der Eingriff wird in Lokalanästhesie durchgeführt. Die Schnittführung orientiert sich an den natürlichen Hautlinien, sodass die Narbe nach dem abblassen kaum ersichtlich ist. Wichtig ist bei jedem Eingriff die exakte Readaptierung der Wundränder. Ist kein einfacher Verschluss möglich, so kann der Wundverschluss mittels Hautverschiebung oder Verpflanzung erzielt werden.

Nach dem Eingriff:

Die Nähte werden je nach Region nach 7-14 Tagen entfernt. Bis dahin kann ein Schutzverband angebracht werden und sie sollten vor Nässe und Sonne geschützt werden.

Die Kosten sind abhängig vom erforderlichen Umfang des Eingriffes und eventuellen zusätzlichen Leistungen (z.B.: Wirkstoffkombinationen oder Kombinationseingriffe). Im Komplettpreis sind die Vor- und Nachbehandlung inkludiert.



WAHLÄRZTIN

DR. MED.
ANDREA OSSBERGER

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

Herrenstraße 54 . 4020 Linz

E office@dr-ossberger.at

T +43 / (0)650 / 66 11 448