

OBERARM STRAFFUNG



DR. MED.
ANDREA OßBERGER

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

Herrenstraße 54 . 4020 Linz

E office@dr-ossberger.at

T +43 / (0)650 / 66 11 448

WAHLÄRZTIN

Durch Gewichtsabnahme als auch im Laufe der Zeit können an den Oberarmen überschüssige Hautfalten entstehen. Je nach Ausprägung kann eine einfache Fettabsaugung den gewünschten Erfolg erzielen, oder es ist ein klassischer Oberarm Lift mit Schnittführung an der Innenseite der Oberarme erforderlich. In jedem Fall ist das oberste Ziel die Verbesserung der Kontur, die Hautstraffung als auch die Schonung der dort vorliegenden Lymphbahnen.

Vor dem Eingriff:

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (Marcoumar, Thrombo ASS,...) eine Woche vor dem geplanten Eingriff, sowie eine Woche danach.

Beschränken Sie oder noch besser stoppen Sie den Nikotinkonsum mindestens für 2 Wochen vor dem Eingriff bzw. 4 Wochen danach.

Während des Eingriffs:

Der Eingriff erfolgt in der Regel in Vollnarkose. Bei der Schnittführung wird darauf geachtet, dass die Narbe so kurz wie möglich bleibt und an der Innenseite der Oberarme zu liegen kommt. Abschließend wird ein Kompressionsverband angebracht.

Nach dem Eingriff:

Sofern Drainagen benötigt wurden werden sie nach 1-2 Tagen entfernt und danach wird die Kompressionswäsche angezogen. Diese soll 24 Stunden täglich für 4-6 Wochen getragen werden.

Die Nähte werden in der Regel nach 14 Tagen entfernt.

Keine Sport, Kein Heben oder Tragen von schweren Lasten für 4-6 Wochen.

Die Kosten sind abhängig vom erforderlichen Umfang des Eingriffes und eventuellen zusätzlichen Leistungen (z.B.: Wirkstoffkombinationen oder Kombinationseingriffe). Im Komplettpreis sind die Vor- und Nachbehandlung inkludiert.